

O INEGALITATE DE TIP CAUCHY-SCHWARZ INSPIRATĂ DE STATISTICĂ

GEORGE STOICA¹⁾

Abstract. We state and prove a result equivalent to the celebrated *Cauchy-Schwarz* inequality, in both continuous and discrete versions.

Keywords: Cauchy-Schwarz inequality, mean, standard deviation.

MSC: 97I40, 97I50.

Să considerăm două funcții continue $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Varianta integrală a inegalității *Cauchy-Schwarz* spune că

$$E^2(fg) \leq E(f^2) \cdot E(g^2), \quad (1)$$

unde $E(\cdot)$ este valoarea integralei (sau media) pe intervalul $[0, 1]$ a funcției din paranteze:

$$E(u) = \int_0^1 u(x) dx.$$

Egalitatea în (1) are loc dacă și numai dacă f și g sunt proporționale, adică există o constantă c astfel ca $f(x) = cg(x)$ pentru orice $x \in [0, 1]$.

O demonstrație elegantă poate fi găsită în [1].

În această notă vom prezenta o inegalitate de tip *Cauchy-Schwarz*, care este de fapt echivalentă cu (1), în sensul că, cele două rezultate se implică unul pe celălalt. Vom folosi notația de mai jos, familiară în teoria probabilităților și statistică:

$$DS(u) = \sqrt{E(u^2) - E^2(u)}$$

(DS înseamnă deviația standard). Atunci avem următoarea inegalitate:

$$E^2(fg) \leq E(f^2) \cdot E(g^2) - \left[|E(f)| \cdot DS(g) - |E(g)| \cdot DS(f) \right]^2. \quad (2)$$

Este clar că (2) implică (1). Reciproc, vom folosi (1) în demonstrația lui (2) în felul următor. Fie a și b numere reale arbitrare; conform cu (1), avem că

$$E^2\left((f-a)(g-b)\right) \leq E\left((f-a)^2\right) \cdot E\left((g-b)^2\right),$$

sau

$$\begin{aligned} E^2(fg) - E(f^2) \cdot E(g^2) &\leq a^2 DS^2(g) + b^2 DS^2(f) - 2aE(f)E(g^2) - \\ &\quad - 2bE(g)E(f^2) + 2abE(f)E(g) + 2\left[bE(f) + aE(g) - ab\right]E(fg). \end{aligned}$$

Fixăm t real pozitiv și alegem

$$a = E(f) + \sqrt{t}, b = E(g) + E(f)E(g)/\sqrt{t}.$$

¹⁾Saint John, New Brunswick, Canada

Obținem $bE(f) + aE(g) = ab$ și deci

$$E^2(fg) - E(f^2) \cdot E(g^2) \leq -aDS^2(g)[2E(f) - a] - bDS^2(f)[2E(g) - b]. \quad (3)$$

Pe de altă parte,

$$\begin{aligned} & aDS^2(g)[2E(f) - a] + bDS^2(f)[2E(g) - b] \\ &= [E^2(f) - t] \left[DS^2(g) - \frac{DS^2(f)E^2(g)}{t} \right] =: f(t). \end{aligned} \quad (4)$$

Limitele lui f la $+\infty$ și 0^+ sunt ambele egale cu $-\infty$. Totodată, funcția f își atinge valoarea maximă

$$\left[|E(f)| DS(g) - |E(g)| DS(f) \right]^2 \text{ pentru } t = \frac{|E(f)E(g)|}{DS(f)/DS(g)}. \quad (5)$$

Ținând cont de (3), (4) și (5), rezultă formula (2).

Egalitatea are loc în (2) când $f(x) = 1$ pentru orice $x \in [0, 1]$ sau, din simetrie, când $g(x) = 1$ pentru orice $x \in [0, 1]$.

Invităm cititorii să găsească toate cazurile de egalitate in (2).

Este interesant de observat varianta discretă a inegalității (2). Să considerăm $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$; atunci avem

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - n^2 \left[|E(x)| DS(y) - |E(y)| DS(x) \right]^2, \quad (6)$$

unde

$$E(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \text{ și } DS(x) = \sqrt{\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - E^2(x)}$$

sunt media, respectiv deviația standard, a lui x (similar definim $E(y)$ și $DS(y)$). Este clar că inegalitatea (6) implică celebra inegalitate *Cauchy-Schwarz* în cazul discret. În continuare vom schița reciproca ultimei afirmații, folosind metoda de la inegalitatea integrală (2). Din

$$\left[\sum_{i=1}^n (x_i - a)(y_i - b) \right]^2 \leq \left[\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 \right] \left[\sum_{i=1}^n (y_i - b)^2 \right]$$

obținem echivalentul formulei (3):

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \leq \\ & \leq -n^2 \left\{ aDS^2(y)[2E(x) - a] + bDS^2(x)[2E(y) - b] \right\}. \end{aligned}$$

Apoi demonstrația decurge identic cu cea din cazul integral.

Egalitatea are loc în inegalitatea *Cauchy-Schwarz* discretă dacă și numai dacă x și y sunt proporționale, adică există o constantă c astfel ca $x_i = cy_i$ pentru orice $i = 1, \dots, n$. Observăm că egalitatea are loc în inegalitatea (5) când $x_i = 1$ pentru orice $i = 1, \dots, n$ sau, din simetrie, când $y_i = 1$ pentru orice $i = 1, \dots, n$.

Invităm cititorii să găsească toate cazurile de egalitate în (5).

BIBLIOGRAFIE

- [1] J.M. Steele, *The Cauchy-Schwarz Master Class: An Introduction to the Art of Mathematical Inequalities*, Cambridge University Press, 2004. În format electronic: <http://www-stat.wharton.upenn.edu/steele/Publications/Books/CSMC/CSMC>.

PENTRU CERCURILE DE ELEVI

ASUPRA UNOR RELAȚII DE CONGRUENȚĂ

FELICIAN PREDA¹⁾ și BOGDAN IORDACHE²⁾

Prezentăm mai întâi un rezultat care îi aparține lui *Lucas* (*François Edouard Anatole Lucas*, matematician francez, 1842-1891).

Lema lui Lucas (1878). *Fie a, b, c, d și p numere naturale, p prim, $a \neq 0, b < p, d < p$. Atunci avem*

$$C_{ap+b}^{cp+d} \equiv C_a^c \cdot C_b^d \pmod{p}.$$

Demonstrația 1. Vom demonstra mai întâi prin numărare. Considerăm un caroiaj de $p \times a$ pătrate dispuse pe p linii și a coloane și, în plus, o coloană cu $b < p$ pătrate. Putem alege $cp + d$ pătrate în C_{ap+b}^{cp+d} moduri. O alegere a celor $cp + d$ pătrate arată astfel: x_1 pătrate de pe coloana 1, x_2 pătrate de pe coloana 2, până la x_a pătrate de pe coloana a și, în plus, x_0 pătrate de pe coloana cu b pătrate.

Cazul 1: Există $i \in \overline{1, a}$ astfel încât $x_i \neq 0$ și $x_i \neq p$. Numărul de alegeri posibile, într-un astfel de caz, este:

$$C_p^{x_1} \cdot C_p^{x_2} \cdot \dots \cdot C_p^{x_a} \cdot C_b^{x_0}$$

Fiecare dintre aceste produse este divizibil cu p deoarece conține cel puțin un termen divizibil cu p .

Cazul 2: Oricare ar fi $i \in \overline{1, a}$ avem $x_i = 0$ sau $x_i = p$. Vom avea în total $C_a^c \cdot C_b^d$ posibilități.

Deci, în total, numărul de posibilități este $M_p + C_a^c \cdot C_b^d = C_{ap+b}^{cp+d}$, de aici concluzia. Dacă $d > b$, alegerea de la cazul 2 nu este posibilă; prin urmare,

¹⁾ Profesor, Șc. Gim. „Gh. Țițeica”, Craiova.

²⁾ Elev, C.N. „Frații Buzești”, Craiova.