

# GIMNAZIU

## Clasa a V-a

**S:E15.203.** Fie  $a = (1 + 2 + 3 + \dots + 2016)^{1+2+3+\dots+2015}$ .

- Determinați ultima cifră a numărului  $a$ .
- Arătați că  $a$  este pătrat perfect.

*Florin Bizău și Ioan Bizău, Sighetu Marmăției*

**S:E15.207.** a) Scrieți numărul 2015 ca sumă de puteri diferite ale lui 2 .

- Scrieți numărul 2015 ca sumă de puteri diferite ale lui 5.

*Angela Lopată, Gârdani*

## Clasa a VI-a

**S:E15.216.** Câte numere prime de trei cifre se transformă în cuburi perfecte dacă schimbăm ordinea cifrelor lor?

*Vasile Ienuțaș, Baia Mare*

**S:E15.220.** Pe dreapta  $d$  se consideră punctele  $A_0, A_1, \dots, A_{50}$ , în această ordine, astfel încât  $A_0A_1 = 1$  cm,  $A_1A_2 = 3$  cm,  $A_2A_3 = 5$  cm,  $\dots$ ,  $A_{49}A_{50} = 99$  cm. Fie  $O$  mijlocul segmentului  $[A_0A_{50}]$ .

- a) Determinați  $p \in \mathbb{N}$  pentru care  $O \in [A_p A_{p+1}]$ .  
 b) Există două numere naturale  $m$  și  $n$ ,  $0 < m < n < 50$  astfel încât punctul  $O$  să fie mijlocul segmentului  $[A_m A_n]$ ?

*Ovidiu Bobb, Copalnic Mănăstur*

### Clasa a VII-a

**S:E15.221.** Fie  $a, b, c$  trei numere naturale impare. Arătați că cel puțin două dintre numerele  $a^4, b^4, c^4$  au suma sau diferența multiplu al lui 10.

*Daniel Stanciu și Elisabeta Stanciu, Beclean*

*Constantin Apostol, Rm. Sărat*

**S:E15.228.** În triunghiul isoscel  $ABC$ , cu  $[AB] \equiv [AC]$ , se consideră bisectoarele ( $AD$ , respectiv ( $CE$  cu  $D \in BC, E \in AB$  și punctul  $F$ , mijlocul lui  $[AC]$ , astfel încât  $EF \perp AC, FD \parallel AB$ .

a) Aflați măsurile unghiurilor triunghiului  $ABC$ .

b) Arătați că triunghiul  $ABP$  este isoscel, unde  $AD \cap EF = \{P\}$ .

*Iulian Bunu, Baia Mare*

### Clasa a VIII-a

**S:E15.234.** Determinați numărul întreg  $a$  astfel încât  $\sqrt{5+4a} + \sqrt{5-4a}$  să fie întreg

*Constantin Apostol, Rm. Sărat*

**S:E15.238.** Pe muchiile ( $DH$ ) și ( $BF$ ) ale paralelipipedului dreptunghic  $ABCDEFGH$  cu  $AD = 6$  cm și  $AE = 6\sqrt{3}$  cm, se consideră punctele  $I$ , respectiv  $J$ , astfel încât semidreapta ( $AI$  să fie bisectoarea unghiului  $\sphericalangle HAD$  și  $\mathcal{A}_{BCGJ} = 5 \cdot \mathcal{A}_{GFJ}$ .

a) Arătați că punctele  $A, I, G$  și  $J$  sunt vârfurile unui paralelogram.

b) Determinați lungimea segmentului  $[AB]$  astfel ca aria paralelogramului  $AIGJ$  să fie egală cu  $40\sqrt{3}$  cm<sup>2</sup>.

*Iulian Bunu, Baia Mare*